

*Pred uporabo natančno preberite to navodilo, ker vsebuje pomembne podatke za vas!
To zdravilo je na voljo brez recepta za lajšanje blažjih težav, ki ne zahtevajo posvetovanja z zdravnikom. Kljub temu ga morate uporabljati pazljivo in skrbno, da vam bo kar najbolj koristilo.
Shranite navodilo. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije.
Če se znaki vaše bolezni ne izboljšajo v 7 dneh, morate obiskati zdravnika.*

Navodilo vsebuje:

1. Kaj je Arnika sprej in za kaj se uporablja
2. Kaj morate vedeti, preden uporabite zdravilo
3. Kako uporabljati Arnika sprej
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje in rok uporabnosti

ARNIKA SPREJ

*Zdravilne učinkovina je: Tinktura Arnike (Arnicae tinctura) (DAB).
Pomožne snovi so: Metilparahidroksibenzoat (Methylis parahydroxybenzoas), Propilparahidroksibenzoat (Propylis parahydroxybenzoas), Etanol (Ethanolum), Prečiščena voda (Aqua purificata), Glicerol (Glycerolum), Poloksamer (Poloxamerum).*

*Ime in naslov izdelovalca:
Goriška lekarna Nova Gorica
Rejčeva ulica 2
5000 Nova Gorica*

1. Kaj je Arnika sprej in za kaj se uporablja

Farmacevtska oblika

Dermalno pršilo

Sestava

1 g Arnika spreja vsebuje 200 mg Tinkture arnike (Arnicae tinctura).

Pomožne snovi so: Metilparahidroksibenzoat (Methylis parahydroxybenzoas), Propilparahidroksibenzoat (Propylis parahydroxybenzoas), Etanol (Ethanolum), Prečiščena voda (Aqua purificata), Glicerol (Glycerolum), Poloksamer (Poloxamerum).

Vsebina

100 ml raztopine v steklenici z zaporko s pršilnim ventilom in zloženki.

Način delovanja

Cvet navadne arnike vsebuje seskviterpenske laktone, ki delujejo protivnetno, analgetično in antiseptično. Cvet navadne arnike pomaga pri hematomi (modricah), pri vnetjih, ki so posledica pikov insektov, furunklih, pri vnetjih sluznic, pri vnetju površinskih ven (flebitis), zmanjša otekline po zvinih in izpahih ter lajša revmatične težave.

Terapevtske indikacije

Arnika sprej uporabljajte zunanje:
pri hematomi (modricah),
pri oteklinah po zvinih in izpahih,
pri vnetjih po piku insektov,
pri furunklih,
kot dodatno terapijo pri zdravljenju vnetja površinskih ven (flebitis),
za lajšanje revmatičnih težav.

2. Kaj morate vedeti, preden uporabite Arnika sprej

Ne uporabljajte Arnika spreja:

če ste preobčutljivi na katerokoli sestavino,
za pršenje na odprte rane,
za pršenje v oči in v bližino oči.

Previdnostni ukrepi in opozorila

Arnika sprej vsebuje etanol. Pogosto nanašanje na kožo lahko povzroči iritacijo in suho kožo.

Če se znaki vaše bolezni ne izboljšajo v 7 dneh, se redno ponavljajo ali poslabšajo, morate obiskati zdravnika.

Medsebojno delovanje z drugimi zdravili

Ni znano, da bi Arnika sprej vplival na delovanje drugih zdravil. Ne nanašajte drugih zdravil za lokalno uporabo hkrati z Arnika sprejem.

Nosečnost

Ni znano, da bi Arnika sprej pri nanosu na kožo ali sluznice škodljivo deloval med nosečnostjo.

Posvetujte se z zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete katerokoli zdravilo.

Dojenje

Ne nanašajte Arnika spreja na dojke. Ni znano, da bi Arnika sprej pri nanosu na kožo ali sluznice škodljivo deloval med dojenjem, razen pri uporabi na dojkah.

Posvetujte se z zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete katerokoli zdravilo.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Ni znano, da bi Arnika sprej vplival na sposobnost upravljanja vozil in strojev.

3. Kako uporabljati Arnika sprej

Odmerjanje in način uporabe

Odrasli in otroci: Arnika sprej nanesite večkrat dnevno v tankem sloju na obolelo mesto.

Če menite, da je učinek zdravila premočan ali prešibak, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Ni znano, da bi Arnika sprej škodljivo deloval pri predoziranju.

Če ste vzeli večji odmerek kot bi smeli, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Ne vzemite dvojnega odmerka, če ste pozabili vzeti prejšnji odmerek.

Trajanje zdravljenja

Če se znaki vaše bolezni ne izboljšajo v 7 dneh, se redno ponavljajo ali poslabšajo, morate obiskati zdravnika.

4. Možni neželeni učinki

Kot vsa zdravila ima lahko tudi Arnika sprej neželene učinke.

Najpogostejša stranska učinka Arnika spreja sta draženje kože in kontaktni dermatitis. Pri dolgotrajni uporabi se lahko razvije dermatitis. Pri podaljšani uporabi na poškodovani koži (npr. ulcus cruris) se lahko pojavi edematozni dermatitis z mehurji. V takih primerih Arnika sprej prenehajte uporabljati.

Če opazite katerikoli neželeni učinek, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

5. Shranjevanje in rok uporabnosti

Rok uporabnosti

Zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na ovojnini.

Shranjevanje

Zdravilo shranjujte temperaturi do 25 °C!

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Način izdajanja zdravila

Zdravilo se izdaja brez recepta v lekarnah in specializiranih prodajalnah.

Datum zadnje revizije navodila

01.06.2005

PREDLOG ZA NAVEDBO PODATKOV NA ZLOŽENKI IN TUBI

1 Ime zdravila

Arnika sprej

2 Kakovostna in količinska navedba zdravilnih učinkovin

Sestava

1 g Arnika spreja vsebuje 200 mg Tinkture arnike (Arnicae tinctura).

4 Pomožne snovi (nujno samo na zloženci, na tubi lahko piše tudi: Pomožne snovi so navedene v navodilu)

Pomožne snovi so: metilparahidroksibenzoat, propilparahidroksibenzoat, etanol, prečiščena voda, glicerol, poloksamer.

3 Farmacevtska oblika in vsebnost

Dermalno pršilo 100 ml

5 Način uporabe zdravila

Odmerjanje in način uporabe

Odrasli in otroci: Arnika sprej nanosite večkrat dnevno v tankem sloju na obolelo mesto.

Arnika sprej uporabljajte pri hematomih (modricah), oteklinah po zvinih in izpahih, vnetjih po piku insektov, furunklih, kot dodatno terapijo pri zdravljenju vnetja površinskih ven (flebitis), za lajšanje revmatičnih težav.

6 Opozorilo

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7 Druga opozorila

Zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na ovojniku.

Če se znaki vaše bolezni ne izboljšajo v 7 dneh, se redno ponavljajo ali poslabšajo, morate obiskati zdravnika.

8 Pogoji shranjevanja

Zdravilo shranjujte pri temperaturi do 25 °C!

9 Datum izteka roka uporabe

05. 2005

10 Izdelovalčeva številka serije izdelave zdravila

G0020504

11 Ime in naslov izdelovalca

Goriška lekarna Nova Gorica

Rejčeva ulica 2

5000 Nova Gorica

12 Opozorilo

Pred uporabo natančno preberite priloženo navodilo!

13 Način in režim izdajanja zdravila

Zdravilo se izdaja brez recepta v lekarnah in specializiranih prodajalnah.

14 Slovenska koda EAN13

383104570207 (prostor za bar kodo)