

Navodilo za uporabo

Slezov sirup

izvleček korenine navadnega sleza

Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu ali navodila zdravnika ali farmacevta.

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet.
- Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte poglavje 4.
- Če se znaki vaše bolezni poslabšajo ali ne izboljšajo v 7 dneh, se morate posvetovati z zdravnikom.

Kaj vsebuje navodilo

1. Kaj je zdravilo Slezov sirup in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Slezov sirup
3. Kako uporabljati zdravilo Slezov sirup
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Slezov sirup
6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

1. Kaj je zdravilo Slezov sirup in za kaj ga uporabljamo

Zdravilo Slezov sirup vsebuje izvleček korenine navadnega sleza. Korenine navadnega sleza vsebujejo sluzi, ki prekrivajo sluznico ustne votline, žrela in grla ter tako zmanjšajo draženje, ki povzroča kašelj. Zdravilo Slezov sirup uporabljamo za pomirjanje suhega in dražečega kašlja pri boleznih dihal. Zdravilo Slezov sirup je primerno za odrasle in otroke. Zdravilo Slezov sirup je tradicionalno zdravilo rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj. Če se znaki vaše bolezni poslabšajo ali ne izboljšajo v 7 dneh, se morate posvetovati z zdravnikom.

2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Slezov sirup**Ne uporabljajte zdravila Slezov sirup**

- če ste alergični na učinkovino ali katero koli sestavino tega zdravila (navedeno v poglavju 6).

Opozorila in previdnostni ukrepi

Pred začetkom uporabe zdravila Slezov sirup se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Če imate obolenje dihalne poti, ki ga spremljajo težko dihanje, vročina, kronični kašelj ali krvav ali gnojni izpljunek, morate takoj obiskati svojega zdravnika.

Sirup vsebuje saharozo, zato ni primeren za sladkorne bolnike.

Otroci

Majhni otroci so dovzetnejši za zaplete prehladnih obolenj. Pri otrocih do 3. leta starosti je priporočljiv posvet z zdravnikom.

Druga zdravila in zdravilo Slezov sirup

Obvestite zdravnika ali farmacevta, če jemljete, ste pred kratkim jemali ali pa boste morda začeli jemati katero koli drugo zdravilo.

Ni poročil o medsebojnem delovanju zdravila Slezov

sirup z drugimi zdravili. Študije o medsebojnem delovanju zdravil niso izvedli. Zaradi vsebovanih sluzi bi bilo vsrkavanje sočasno zaužitih zdravil lahko zmanjšano. Zato iz previdnostnih razlogov svetujemo, da zdravilo Slezov sirup vzamete eno uro pred ali eno uro po jemanju drugih zdravil.

Zdravilo Slezov sirup skupaj s hrano in pijačo

Neposredno po zaužitju tega zdravila ne uživajte druge hrane ali pijače, ker bi lahko le-ta pospešila odstranjevanje sirupa s sluznice ust in žrela. Zato svetujemo zaužitje tega zdravila po jedi.

Nosečnost in dojenje

Če ste noseči ali dojite, menite, da bi lahko bili noseči ali načrtujete zanositev, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete to zdravilo. Podatkov o varnosti uporabe zdravila Slezov sirup med nosečnostjo in dojenjem ni.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Ni znano, da bi zdravilo Slezov sirup vplivalo na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji.

Zdravilo Slezov sirup vsebuje saharozo

Če vam je zdravnik povedal, da ne prenašate nekaterih sladkorjev, se pred uporabo tega zdravila posvetujte s svojim zdravnikom.

5 ml sirupa vsebuje 4,2 g saharoze. Če to zdravilo jemljete v skladu z navodilom za odmerjanje, zaužijete z vsakim odmerkom 4,2 g do 12,6 g saharoze. To morajo upoštevati sladkorni bolniki.

Zdravilo Slezov sirup vsebuje metilparahidroksibenzoat (E218) in propilparahidroksibenzoat (E216)

Lahko povzročita alergijske reakcije (lahko zapoznele).

3. Kako uporabljati zdravilo Slezov sirup

Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu ali navodila zdravnika ali farmacevta. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Priporočeni odmerek je:

- Odrasli in mladostniki, starejši od 12 let: 10 ml do 15 ml sirupa 3- do 5-krat dnevno.

Uporaba pri otrocih

- Otroci, stari od 6 do 12 let: 5 ml sirupa 3- do 5-krat dnevno.
- Otroci, stari od 3 do 6 let: 5 ml sirupa do 4-krat dnevno.
- Otroci, stari od 6 mesecev do 3 leta: 2,5 ml sirupa 2- do 3-krat dnevno.

Pri otrocih do 3. leta starosti je zaradi pomankanja podatkov v splošnem priporočljiv posvet z zdravnikom. Sirup nekoliko razredčite z vodo ali čajem.

Svetujemo, da sirup zaužijete po jedi. Svetujemo tudi, da ob sirupu uživete veliko tekočine. Pred uporabo steklenico pretresite. Po uporabi steklenico dobro zaprite.

Če ste uporabili večji odmerek zdravila Slezov sirup, kot bi smeli

Če ste uporabili večji odmerek zdravila Slezov sirup, kot bi smeli in če se po prevelikem odmerku pojavijo neželeni učinki, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Ni poročil o primerih prevelikega odmerjanja sirupa.

Če ste pozabili vzeti zdravilo Slezov sirup

Ne vzemite dvojnega odmerka, če ste pozabili vzeti prejšnji odmerek. Zdravilo Slezov sirup vzemite, ko se spomnite in zdravljenje nadaljujete v skladu z navodili. Če je že skoraj čas za naslednji odmerek, pozabljeni odmerek izpustite in z jemanjem sirupa nadaljujete v skladu z navodili za odmerjanje.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

4. Možni neželeni učinki

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Neželeni učinki tega zdravila niso znani. V redkih primerih se lahko pojavi alergija na (preobčutljivost za) sestavine tege zdravila.

Poročanje o neželenih učinkih

Če opazite katerega koli izmed neželenih učinkov, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. O neželenih učinkih lahko poročate tudi neposredno na:

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke,
Sektor za farmakovigilanco
Nacionalni center za farmakovigilanco
Slovenčeva ulica 22
SI-1000 Ljubljana

Tel: +386 (0)8 2000 500
Faks: +386 (0)8 2000 510
E-pošta: h-farmakovigilanca@jazmp.si
Spletna stran: www.jazmp.si

S tem, ko poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega zdravila.

5. Shranjevanje zdravila Slezov sirup

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Zdravilo po uporabi dobro zaprite in shranjujte pri temperaturi do 25 °C. Shranjujte zaščiteno pred svetlobo in v originalni ovojni.

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na škatli in steklenici poleg oznake »Uporabno do«. Rok uporabnosti zdravila se izteče na zadnji dan navedenega meseca.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjne odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne uporabljate več, se posvetujte s farmacevtom. Taki ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

Kaj vsebuje zdravilo Slezov sirup

Učinkovina je izvleček korenine navadnega sleza.

5 ml (6,5 g) sirupa vsebuje 2,35 g tekočega izvlečka korenine navadnega sleza (*Althaea officinalis L., radix*) (1:14,4), kar ustreza 163,5 mg korenine navadnega sleza. Ekstrakcijsko topilo je prečiščena voda.

Pomožne snovi so saharoza, prečiščena voda, metilparahidroksibenzoat (E218) in propilparahidroksibenzoat (E216).

Izgled zdravila Slezov sirup in vsebina pakiranja

Zdravilo Slezov sirup je gosta, viskozna tekočina svetlo rumene do rjavkaste barve.

Sirup je pakiran v temno steklenico z zaporko. V steklenici je 250 g sirupa. Steklenica s priloženo merilno posodico je vstavljena v škatlico.

Proizvajalec zdravila

Goriška lekarna Nova Gorica
Rejčeva ulica 2
5000 Nova Gorica

Za vse morebitne nadaljnje informacije o tem zdravilu se lahko obrnete na proizvajalca:
Goriška lekarna Nova Gorica
Rejčeva ulica 2
5000 Nova Gorica

E-pošta: gal.lab@goriskalekarna.si

Navodilo je bilo nazadnje revidirano oktobra 2024.